

5/2.4
Bergen, 23.4.1974
LAa/LGV

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J. 473.

ENDRINGER I FORSKRIFTER AV 29. SEPTEMBER 1969 OM
LEGEMIDLER M.V. PÅ FISKE- OG FANGSTFARTØY

I henhold til §§ 47 og 52 i lov om Statskontrol med Skibes Sjødyktighet av 9. juni 1903 med senere endringer, jfr. kgl. res. av 13. juni 1969, bestemmer Sosialdepartementet at det i ovennevnte forskrifter skal foretas følgende endringer:

§ 9. Håndbøker m.v.

Bestemmelsen i paragrafens punkt 4,3 om at fiske- og fangstfartøy som anvendes utenfor 90 nautiske mil av den norske kyst skal ha tilstrekkelig antall blanketter for legekonsultasjon over radio, utgår.**

§ 10. Dispensasjoner

Som nytt punkt 3. tilføyes:

Helsedirektøren kan foreta endringer i eller tilføyelser til forskriftene eller bilagene.

** Merknad:

En veiledning i gjenopplivning ombord, utgitt av Helsedirektoratet, vil bli trykt i nær framtid og skal medføres om bord.

Bilag A.

I. LEGEMIDLER

Acetfenolisatintabletter. Preparatet utgår.

Etter Alminoxtabletter tilføyes:

Ampicillintabletter 0,5 g
 Doktacillin "Astra"
 Pentrexyl "A.L."
 Tablets containing Ampicillin

Til behandling av gonorré, se særskilt veiledning.

Pakning: Minste (18 eller 20 tabletter)

Liste: 1: 1

2: 2

3: 3

Fenoxymetylpenicillintabletter 0,16 g erstattes med:

Fenoxymetylpenicillintabletter 0,32 g.

Bruksrettledningen endres til:

Penicillintabletter ved infeksjonssykdommer:

1-2 tabletter 3-4 ganger daglig etter hvor alvorlig infeksjonen er, til temperaturen har vært normal i 2 dager. I alvorligere tilfelle kan dosen forhøyes til det dobbelte.

Hexafenkrem. Preparatet utgår.

Klorokintabletter 0,25 g.

Bruksrettledningen endres til:

Forebyggende: 2 tabletter 1 gang i uka på samme ukedag fra 1 uke før ankomst til 2 uker etter avgang fra malariasmittet strøk.

Behandling : 4 tabletter med en gang, deretter 2 tabletter daglig i 3 dager.

Petidininjeksjonsvæske 5% N.B!

Pakning endres til: Ampuller a 2 ml, 5 stk. **

Etter Petidininjeksjonsvæske tilføyes:

Probenecidtabletter 0,5 g.
Probecid "Astra"

Brukes sammen med ampicillin ved behandling av gonorré,
se særskilt veiledning.

Pakning: 50 stk.

Liste: 1: 1
2: 1
3: 1

Etter Salttabletter tilføyes:

Senokot tabletter "Nyco"
Tablets of Pericarpium Sennae
Avføringsmiddel: 1-4 tabletter om aftenen.
Pakning: 100 stk.

Liste: 1: 1
2: 1
3: 2

Tetrakainkloridlameller utgår, og isteden oppføres:
Tetrakainkloridøyedråper 1% i endosebeholdere (Minims).

Til lokalbedøvning av øyet og ved sveiseblink.
1-2 dråper dryppes i konjunktivalsekken.

Pakning: 1 x 20 enheter

Liste: 2: 2
3: 2

** Merknad:

Apotekene bes påse at ampulle-fil og nødvendig antall engangssprøyter med kanyler vedlegges pakningene.

III. REAGENSER

I stedet for Hematest oppføres Hemastix.

Bilag C.

LEGEMIDLER ORDNET ETTER ANVENDELSESOMRÅDE

Følgende tilføyelser og endringer føres opp i alfabetisk orden under de enkelte grupper.

1. Midler ved infeksjonssykdommer:

Ampicillintabletter 0,5 g tilføyes.
Fenoxymetylpenicillintabletter 0,16 g erstattes med:
Fenoxymetylpenicillintabletter 0,32 g.

3. Smertestillende midler:

Tetrakainkloridlameller 0,25 mg utgår, og i stedet oppføres:
Tetrakainkloridøyedråper 1% i endosebeholdere.

4. Avføringsmidler:

Acetfenolisatintabletter utgår, og i stedet oppføres:
Senokot tabletter "Nyco".

8. Ved øyesykdommer:

Tetrakainkloridlameller utgår, og i stedet oppføres:
Tetrakainkloridøyedråper 1% i endosebeholdere.

Tillegg.

Rettledning ved behandling av enkelte sykdommer.

Penicillin-, tetracyklin- og sulfapreparater.

Under II Penicillinpreparater gjøres følgende endring:

- 1) Penicillin til peroral bruk (tabletter).

Hver tablett inneholder 0,32 g fenoksymetylpenicillin (ca. 500 000 enheter). Når penicillin tas gjennom munnen (i tablettform) må det nyttes langt større doser enn ved injeksjoner av stoffet.

Under vanlig dosering endres første punktum slik:
1-2 tabletter 3-4 ganger daglig etter hvor alvorlig infeksjonen er til temperaturen har vært normal i 2 dager.

Behandling av kjønnsykdommer

A. Gonorrhé (dryppert).

Tredje ledd rettes til:

Ampicillin (et nyere penicillin) foretrekkes når behandlingen må iverksettes om bord uten legetilsyn. Det er en fordel ved behandlingen med dette medikamentet at det kan gis som en engangsdose, helst i kombinasjon med probenecid.

Dosering: På en gang gis 4 tabletter ampicillin 0,5 g og 2 tabletter probenecid 0,5 g. Hvis probenecid ikke finnes om bord, gis 3 tabletter ampicillin to ganger med en dags mellomrom.

Nytt fjerde ledd skal lyde:

Tetracyklin brukes i tilfeller av penicillinallergi eller ved andre usikkerhetsfaktorer. Følgende dosering bør brukes:

Som startdose gis 4 kapsler (tabletter) tetracyklin a 0,25 g (250 mg) på én gang, etterfulgt av 1 kapsel 4 ganger daglig samme dag - i alt 8 kapsler i løpet av første døgn. Deretter gis 1 kapsel 4 ganger daglig (1 kapsel hver 6. time) i ytterligere minst 2 døgn. Til sammen kreves det minst 16 kapsler til en full kur.

De øvrige ledd forskyves tilsvarende.

Sjuende ledd, tidligere sjette ledd, skal lyde:

Følgende behandlingsskjema bør benyttes:

Tablettbehandling: Se ovenfor under ampicillin.

Åttende ledd, tidligere sjuende ledd, skal lyde:

Sprøytebehandling:

1 dose hurtigvirkende penicillin (benzylpenicillin-natrium) 0,6 g (ca. 1 million enheter) samt 2 doser langsomtvirkende benzylpenicillinprokain (prokain-penicillin G) 1 200 000 enheter, settes intramuskulært samme dag. Neste dag gjentas samme behandling.

Forskriftene trer i kraft straks. Utskiftningen av utstyr skal være gjennomført innen et år.
